

## INSTRUCTIVO PARA PACIENTES – TEST DE GRAHAM

---

### I. INSTRUCTIVO PREVIO AL PROCEDIMIENTO

- 1) La aplicación de esta técnica debe ser efectuada por una persona que no sea el paciente
- 2) No se deben aplicar pomadas o polvos-talco en la región anal durante la noche anterior
- 3) La toma de muestra se debe efectuar a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o defecar
- 4) Efectúe la técnica durante cinco días seguidos, utilizando una placa diferente cada mañana.

### II. PROCEDIMIENTO

- 1) Desprenda de la placa de vidrio la tira de papel celofán (scotch transparente).
- 2) Aplique varias veces la tira de papel celofán, por el lado engomado, en todos los alrededores del ano y entre las nalgas.
- 3) Pegue el scotch bien estirado en la placa de vidrio.
- 4) Si detecta "pidulle", colóquelo entre el papel celofán (scotch) y la placa de vidrio.
- 5) Cada día, coloque la placa de vidrio en el envase correspondiente, hasta completar las cinco muestras
- 6) Escriba en el envase, con letra muy clara, el nombre, los dos apellidos y la edad del paciente.
- 7) Lleve las placas de vidrio al Laboratorio.